

Dénomination du médicament

**SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES**  
**Glycérol**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?
3. Comment utiliser SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : LAXATIF PAR VOIE RECTALE - code ATC : A06AX01

Ce médicament est un suppositoire. Il est préconisé dans certaines constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?**

**N'utilisez jamais SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES :**

- si vous êtes allergique au glycérol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- En cas de colopathie obstructive, compte tenu de l'effet laxatif du médicament.
- En cas de syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée et inflammatoire (rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn...).

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES.

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.

Constipation occasionnelle :

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :

Elle peut être liée à deux causes :

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres :

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...)
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament en cas de crise hémorroïdaire, de fissure anale ou de rectocolite hémorragique.

#### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

#### **Autres médicaments et SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

#### **SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

#### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé ponctuellement pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **3. COMMENT UTILISER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.

Adultes : La dose recommandée est de 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle à renouveler 1 fois dans la demi-heure ou l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.

#### **Si vous avez utilisé plus de SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES que vous n'auriez dû**

En cas d'utilisation excessive ou prolongée, risque accru de rectites et de diarrhée. Traitement : arrêt du traitement ou diminution de la posologie.

#### **Si vous oubliez d'utiliser SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES**

Sans objet.

#### **Si vous arrêtez d'utiliser SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- sensation de brûlures anales.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament doit être conservé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES**

- La substance active est :

Glycérol..... 1,92 g

- Les autres composants sont :

Gélatine, eau purifiée.

### **Qu'est-ce que SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de suppositoires : Boite de 10, 25, 50 et 100 suppositoires.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**P&G HEALTH FRANCE**  
163/165, QUAI AULAGNIER  
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**P&G HEALTH FRANCE**

18C BOULEVARD WINSTON CHURCHILL  
21000 DIJON

**Fabricant**

**SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE (S.P.P.H.)**

7 IMPASSE DES BOUSSENOTS  
21800 QUETIGNY-LES-DIJON

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).